

## TD 6 - Intégration

### Calcul intégral

**Exercice 1. -**

Calculer les primitives suivantes :

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx ; \quad \int 3x\sqrt{1+x^2} dx ; \quad \int \frac{1}{x \ln x} dx ; \quad \int \frac{e^{3x}}{1+e^{3x}} dx ; \quad \int \cos(x) \sin^2(x) dx$$

$$\int \frac{1-x^2}{(x^3-3x+1)^3} dx ; \quad \int \frac{x-1}{\sqrt{x(x-2)}} dx ; \quad \int \frac{1}{x \ln(x^2)} dx ; \quad \int (3x-1)(3x^2-2x+3) dx$$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx ; \quad \int (1-\cos(3x)) dx ; \quad \int x \sin(x^2) dx ; \quad \int \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx$$

**Exercice 2. -**

(Intégration par parties) Calculer les primitives suivantes :

$$\int e^x \cos x dx ; \quad \int \frac{\ln x}{x^n} dx \quad n > 1 ; \quad \int x \operatorname{Arctan} x dx ; \quad \int (x^2 + x + 1)e^x dx.$$

$$\int e^{-x} \sin x dx ; \quad \int (\ln x)^2 dx ; \quad \int \operatorname{Arctan} x dx ; \quad \int x^3 \sin x dx.$$

**Exercice 3. -**

Calculer les primitives suivantes :

- |  |  |
|--|--|
| 1. $\int \frac{1}{\sqrt{2+x} + \sqrt[3]{2+x}} dx, \quad (t = \sqrt[6]{2+x})$ | 5. $\int \cos \sqrt{x} dx.$                  |
| 2. $\int (\arcsin x)^2 dx$   | 6. $\int \frac{1+e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ |
| 3. $\int x^2 \sqrt{1+x^3} dx.$   | 7. $\int \frac{e^{\tan x}}{(\cos x)^2} dx$   |
| 4. $\int \frac{e^x}{(3+e^x)\sqrt{e^x-1}} dx$                                 | 8. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$        |

**Exercice 4. -**

Décomposer les fractions rationnelles suivantes ; en calculer les primitives.

$$1. \frac{x^3}{x^2 - 4}.$$

$$2. \frac{4x}{(x-2)^2}.$$

$$3. \frac{3t+1}{t^2-2t+10}.$$

$$4. \frac{1}{t^3+1}.$$

$$5. \frac{x^3+2}{(x+1)^2}.$$

$$6. \frac{x+1}{x(x-2)^2}.$$

$$7. \frac{x^2-2x}{(x-1)^2(x^2+1)}.$$

**Exercice 5. -**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $[0, 4]$  par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 < x \leq 4. \end{cases}$$

$$1. \text{ Calculer } \int_0^4 f(t) dt.$$

$$2. \text{ Soit } x \in [0, 4], \text{ calculer } F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

3. Montrer que  $F$  est une fonction continue sur  $[0, 4]$ . La fonction  $F$  est-elle dérivable sur  $[0, 4]$  ?

**Exercice 6. -**

Calculer les intégrales suivantes :

$$1. \int_1^3 |2t - 5| dt,$$

$$2. \int_0^\pi \sqrt{E(t)} dt,$$

$$3. \int_0^\pi \text{Min}(2, t) dt,$$

$$4. \int_{-1}^2 t|t| dt.$$

**Exercice 7. -**

Calculer les intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt \quad ; \quad \int_0^a \sqrt{a^2-t^2} dt \quad ; \quad \int_0^\pi t^2 \sin t dt \quad ; \quad \int_{1-\frac{\pi^2}{4}}^1 \cos \sqrt{1-t} dt$$

$$\int_{-1}^1 \frac{t-1}{1+t^2} dt \quad ; \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{2+\sin t} \quad ; \quad \int_1^4 \frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}} dt \quad ; \quad \int_1^4 \frac{dt}{1+e^t} \quad ; \quad \int_0^1 t(\text{Arctant})^2 dt$$

**Exercice 8. -**

(Changement de variable) calculer les intégrales suivantes : Considérons l'intégrale

$$I = \int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$$

Effectuer le changement de variables  $u = \sqrt{e^x - 1}$  et calculer  $I$ .

*Résultat :  $I = 2 - \pi/2$ .*

**Exercice 9.** -

1- Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue. Montrer que  $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$ , en déduire le valeur de l'intégrale

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan(x))dx.$$

2-Montrer que

$$\int_{\frac{1}{a}}^a \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \arctan x \, dx = \frac{\pi}{2} \left(a - \frac{1}{a}\right)$$

pour  $a > 1$ ,

(Indication : utiliser la formule  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$ , pour  $x > 0$ ).

Calcul des suites

**Exercice 10.** -

Soit  $I_n = \int_0^1 (1 - t^2)^n dt$ .

1. Établir une relation de récurrence entre  $I_n$  et  $I_{n+1}$ .
2. Calculer  $I_n$ .

**Exercice 11** (Intégrales de Wallis). -

Soit  $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$ .

1. Établir une relation de récurrence entre  $I_n$  et  $I_{n+2}$ .
2. En déduire  $I_{2p}$  et  $I_{2p+1}$ .
3. Montrer que  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et strictement positive.
4. En déduire que  $I_n \sim I_{n+1}$ .
5. Calculer  $nI_n I_{n+1}$ .
6. Donner alors un équivalent simple de  $I_n$ .

**Exercice 12.** -

Soit  $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ .

1. En majorant la fonction intégrée, montrer que  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}} \rightarrow 0$ .
2. Calculer  $I_n + I_{n+1}$ .
3. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k} \right)$ .

**Exercice 13.** -

Calculer :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} ; \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \frac{e^{-\frac{n}{k}}}{k^2} ; \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n+k}{n^2+k^2} ; \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n^2-k^2}}.$$

**Exercice 14.** -

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{p=1}^n \frac{n}{n^2 + p^2}.$$

**Exercice 15.** -

Sans calculer les intégrales, montrer que

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx.$$

Pour aller plus loin

**Exercice 16.** -

Soit  $f \in C^0(\mathbb{R})$ . On définit  $g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ .

1. Montrer que  $g$  se prolonge par continuité en 0.
2. On suppose  $f$   $T$ -périodique. Montrer que :  $\forall k \in \mathbb{N}$ ,  $\int_{kT}^{(k+1)T} f(t) dt = \int_0^T f(t) dt$ .
3. Ecrire  $g(x)$  sous la forme  $\frac{1}{x} \int_0^{nT} f(t) dt + \frac{1}{x} \int_{nT}^x f(t) dt$  pour un entier  $n$  bien choisi, et en déduire que  $g$  admet une limite en  $+\infty$ .

**Exercice 17.** -

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue sur  $\mathbb{R}$  et  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ .

Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

1.  $F$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $F$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  de dérivée  $f$ .
3. Si  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  alors  $F$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .
4. Si  $f$  est positive sur  $\mathbb{R}$  alors  $F$  est positive sur  $\mathbb{R}$ .
5. Si  $f$  est positive sur  $\mathbb{R}$  alors  $F$  est croissante sur  $\mathbb{R}$ .
6. Si  $f$  est  $T$ -périodique sur  $\mathbb{R}$  alors  $F$  est  $T$ -périodique sur  $\mathbb{R}$ .
7. Si  $f$  est paire alors  $F$  est impaire.

**Exercice 18.** -

Déterminer les fonctions  $f$  continues sur  $[a, b]$  telles que  $\int_a^b f(t) dt = (b - a) \sup_{[a, b]} |f|$ .